

Дезинфекция			
Объект обработки	Активно в отношении	Конц/Эксп	Способ обработки
Гигиеническая обработка рук	Грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т. ч. возбудителей ИСМП, микобактерий туберкулеза);	3 мл / 30 сек;	Протирание;
	Вирусные инфекции (в т. ч. вирусов гепатита В и С, ВИЧ, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов)	3 мл / 30 сек;	Протирание;
	Патогенные грибы;	3 мл / 30 сек;	Протирание;
Обработка рук хирургов	Грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т. ч. возбудителей ИСМП, микобактерий туберкулеза);	5 мл / 2,5 мин;	Протирание двукратно;
	Вирусные инфекции (в т. ч. вирусов гепатита В и С, ВИЧ, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов)	5 мл / 2,5 мин;	Протирание двукратно
	Патогенные грибы;	5 мл / 2,5 мин;	Протирание двукратно
Операционное поле, локтевые сгибы доноров	Грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т. ч. возбудителей ИСМП, микобактерий туберкулеза);	- / -	Двукратное протирание с последующей выдержкой 2 мин;
	Вирусные инфекции (в т. ч. вирусов гепатита В и С, ВИЧ, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов)	- / -	Двукратное протирание с последующей выдержкой 2 мин;
	Патогенные грибы;	- / -	Двукратное протирание с последующей выдержкой 2 мин;
Инъекционное поле	Грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т. ч. возбудителей ИСМП, микобактерий туберкулеза);	- / -	Однократное протирание с последующей выдержкой 1 мин;
	Вирусные инфекции (в т. ч. вирусов гепатита В и С, ВИЧ, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов)	- / -	Однократное протирание с последующей выдержкой 1 мин;
	Патогенные грибы;	- / -	Однократное протирание с последующей выдержкой 1 мин;
Профилактика вирусных инфекций		- / -	3 раза по 30 сек. каждый;
Профилактика туберкулеза		- / -	2 раза по 30 сек. каждый;